

## وضعیت سلامت عمومی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نیمسال

### اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

احسان فکور<sup>۱</sup>، دکتر محمد مسعود وکیلی<sup>۲</sup>، بهرام رستمی<sup>۳</sup>، ندا محمدیگی<sup>۴</sup>

نویسنده مسؤول: زنجان، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی Ehsan.fakour@gmail.com

پذیرش: ۹۴/۷/۲۶ دریافت: ۹۴/۳/۲۶

### چکیده

**زمینه و هدف:** از آنجایی که وظیفه دانشگاه تربیت نیروی انسانی وارسته و کارآمد می‌باشد و این امر نیز با رشد متوازن فرد در تمامی جوانب از جمله سلامت روحی و روانی مقدور می‌باشد، لذا این مطالعه باهدف بررسی سلامت عمومی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ انجام شد.

**روش بررسی:** این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر کلیه‌ی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ بود که تعداد آن‌ها بالغ بر ۷۱۴ نفر بود. نمونه‌گیری پژوهش بهصورت سرشماری انجام گرفت. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه استاندار سلامت عمومی گلابیگ (GHQ-28) استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین‌ها، انحراف استاندارد و ...) استفاده گردید.

**یافته‌ها:** از مجموع ۷۱۴ دانشجو تعداد ۱۰۶ نفر (درصد ۱/۳۵) نفر معادل ۲/۶۴ درصد دختر بودند. بیشترین فراوانی سنی مربوط به رده سنی ۱۸ تا ۲۲ سال بودند. میانگین و انحراف معیار گروه اول (پایین نمره برش) به ترتیب ۱۰/۱۳ و ۵/۱۳ و نیز گروه دوم (بالای نمره برش) ۳۵/۰۲ و ۱۲/۳۳ بود. در میان خردۀ مقیاس‌های سلامت عمومی مؤلفه کارکرد اجتماعی دارای بیشترین تعداد دانشجو بود که نمره برش را رد نموده و مشکوک به اختلال بودند (۱۸۲ نفر ۲/۳۹ درصد) و اختلال در سلامت عمومی دختران (۳۳۳ نفر ۱۴ درصد) دارای شیوع بالاتری بود.

**نتیجه‌گیری:** نمره کلی سلامت عمومی دانشجویان در سطح مطلوبی در این مطالعه گزارش شد، تنها در مؤلفه کارکرد اجتماعی وضعیت دانشجویان نامطلوب به نظر می‌رسید، لذا مؤسسات آموزشی می‌توانند با برنامه‌ریزی صحیح آموزشی فرهنگی در جهت تسريع افزایش مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی نقش بسیار مهمی را ایفا نمایند.

**وازگان کلیدی:** سلامت عمومی، دانشجویان جدیدالورود، دانشگاه علوم پزشکی زنجان

### مقدمه

یکی از وظایف مهم دانشگاه‌ها تربیت نیروهای متعدد و متخصص برای توسعه و پیشرفت کشور است. در این راستا، کمک به پیشبرد وضعیت تحصیلی و جلوگیری از افت و ترک تحصیل در دانشجویان لازم است. دانشجویانی که دچار

۱- کارشناس مسئول آموزش تخصصی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

۲- دکتری تخصصی آموزش بهداشت، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

۳- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مرکز مشاوره دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

۴- کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

دانشجویان ۷/۲۲ درصد می‌باشد که سهم زنان بیش از مردان می‌باشد<sup>(۵)</sup>. نتایج یک تحقیق دیگر که در آمریکا انجام گرفت، نشان داد علائم جسمانی، اضطراب، وسوسات و حساسیت در روابط متقابل دانشجویان نسبت به جمعیت عادی به ترتیب با افزایش خفیف، متوسط و قابل ملاحظه رو برو بوده وزنان نسبت به مردان عالیم بیشتری را از خود نشان دادند.<sup>(۶)</sup>

در تحقیقات انجام گرفته در دانشگاه‌های علوم پزشکی زاهدان، شهید بهشتی و دانشگاه اصفهان به ترتیب ۸/۳۸، ۱/۳۶ و ۲۰/۵۵ درصد نابهنجاری در سلامت عمومی (نمره بالاتر از نقطه برش) را گزارش داده‌اند<sup>(۷)</sup>، همچنین در مطالعات انجام گرفته در دانشگاه فردوسی مشهد و سنترج نیز نشان داده شده که اختلال در سلامت عمومی در دانشجویان پسر بیشتر از دختر بوده است<sup>(۸)</sup>. ایمانی<sup>(۹)</sup> در تحقیق دیگری با عنوان بررسی سلامت عمومی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که بر روی ۹۵ نفر از دانشجویان پرستاری انجام گرفت، نتایج نشان داد که درصد از دانشجویان دچار اختلال در سلامت عمومی بودند که بعد اختلال عملکرد اجتماعی با ۷/۵۴ درصد بالاترین فراوانی اختلال را در بین دیگر ابعاد داشت<sup>(۹)</sup>. توکلی زاده نیز با بررسی سلامت روانی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی گناباد نشان داد که ۶/۳۱ درصد از دانشجویان بالای نقطه برش قرار دارند و مشکوک به اختلال سلامت روان هستند و همچنین میزان شیوع در پسران و دختران به ترتیب ۲۷ و ۳۳ درصد و نیز در بین دانشجویان مجرد و متاهل به میزان ۳۱ و ۳۳ درصد بود<sup>(۱۰)</sup>. نتایج مطالعه مقصودی نشان داد که ۳۳/۶ درصد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان مشکوک به ابتلا به اختلالات روانی یا جسمانی هستند و سلامت عمومی دانشجویان با وضعیت اقتصادی و فعالیت بدنی رابطه‌ی مستقیم داشت و با بعد خانوار رابطه‌ی غیرمستقیم و معنی دار را نشان داد<sup>(۱۱)</sup>. قمری گیوی نیز در

افت تحصیلی می‌شوند، مستعد گرایش به رفتارهای منفی بوده و خساراتی را به خود و جامعه وارد می‌کنند. زندگی دانشجویی به دلیل شرایط خاص، با بروز استرس‌های گوناگونی همراه است. بسیاری از دانشجویان با ورود به محیط دانشگاه و جدایی از خانواده، دچار احساس تنها و ازدواج می‌شوند. از سوی دیگر، مواجهه با تیپ‌های شخصیتی مختلف درمحیط حرفه‌ای و خوابگاه، عدم کفایت امکانات رفاهی، کمبودهای اقتصادی، کاهش منابع حمایتی و نظارت خانواده، آنان را در معرض اختلال‌های روان شناختی قرار می‌دهد. اختلالات روانشناختی مشکلات فراوانی برای دانشجویان که از اقسام مستعد و برگزیده جامعه می‌باشند ایجاد کرده و بر عملکرد تحصیلی آنان به شدت اثر گذشته و رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی آنان را مختل می‌نماید<sup>(۱)</sup>.

بسیاری از صاحب‌نظران مفاهیم بهداشت روانی و سلامت روانی را به یکدیگر نزدیک می‌دانند اما برخی آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازند و به همین دلیل معتقدند که بهداشت روانی یعنی نگاه‌داشتن سلامت روانی، ریشه‌کن کردن عوامل بیماری‌زا، پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های روانی و ایجاد یک زمینه‌ی مساعد برای رشد و شکفتن شخصیت و استعدادهای نهفته انسان می‌باشد<sup>(۲)</sup>. بر طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامتی عبارت است از حالت کامل رفاه جسمی، روانی اجتماعی و نه فقدان بیماری یا ناتوانی، با توجه به این تعریف می‌توان گفت برای تأمین سلامتی حتماً باید جزء روانی آن را در نظر گرفت<sup>(۳)</sup>.

پژوهش‌های انجام گرفته پیرامون سلامت روانی دانشجویان کشور نشان داده‌اند که حدود ۵/۱۶ تا ۶/۴۶ درصد دانشجویان از مشکلات سلامت روانی رنج می‌برند<sup>(۴)</sup>. بیلر و همکاران در سال ۲۰۰۸ در آمریکا در پژوهشی بهمنظور تعیین میزان شیوع علائم مختلف روان‌شناختی، با استفاده از پرسشنامه GHQ نشان دادند که میزان شیوع اختلالات روان‌شناختی در

جدید در روابط و سازگاری با محیط می‌گردد<sup>(۵)</sup>. همچنین اختلالات روان‌شناختی مشکلات فراوانی برای دانشجویان که از افسار مستعد و برگزیده جامعه می‌باشند ایجاد کرده و بر عملکرد تحصیلی آنان بهشت اثر گذاشته و رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی آنان را مختلف می‌نماید<sup>(۶)</sup>. از سوی دیگر، مواجهه با تیپ‌های شخصیتی مختلف در محیط حرفه‌ای و خوابگاه، عدم کفايت امکانات رفاهی، کمبودهای اقتصادی، کاهش منابع حمایتی و نظارت خانواده، آنان را در معرض اختلالات روان‌شناختی قرار می‌دهد<sup>(۷)</sup>. بنابراین پژوهش حاضر باهدف تعیین وضعیت سلامت عمومی دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام گرفت.

### روش بررسی

روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود که وضعیت سلامت عمومی دانشجویان را مورد بررسی قرارداد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان ورودی جدید در مقطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی زنجان به تعداد ۴۷۵ نفر در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴ بود. نمونه‌گیری پژوهش حاضر به صورت سرشماری انجام گرفت. توزیع پرسشنامه‌ها از طریق همکاران اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی زنجان در زمان ثبت نام دانشجویان ورودی جدید انجام شد دانشجویانی که فرآیند ثبت نام خود را به پایان می‌رسانندن به همکاران اداره مشاوره مراجعه و نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام می‌کردن، لازم به ذکر است که پرسشنامه سلامت عمومی به صورت سالیانه توسط دانشجویان ورودی جدید تکمیل می‌گردد. ابزار گردآوری داده‌ها عبارت بود از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبگ (GHQ-28)، این پرسشنامه یک پرسشنامه غربالگری (سرندي) مبتنی بر روش خود گزارش دهنی است که دارای ۴ خرده مقیاس فرعی (سلامت جسمی، کارکرد اجتماعی، افسردگی، اضطراب) می‌باشد که هر کدام ۷ پرسش

تحقيقی با استفاده از آزمون GHQ-28 و پرسشنامه عامل‌های بنیادی و مقیاس کارکرد دفاعی (DFS) به بررسی نقش سطوح کارکردهای دفاعی و عامل‌های بنیادی در قلمرو بهداشت روانی اقدام نمود. نتایج پژوهش او نشان داد که دانشجویان مشکوک به اختلال روانی به قطب منفی عامل‌های بنیادی گرایش بیشتر دارند و میانگین نمره آن‌ها به صورت معنی‌داری بیشتر است، به علاوه، گرایش به قطب‌های منفی یعنی (نامیدی، حضور ذهن پایین، تفکر شبه انضمایی، عزت نفس پایین، سرزنش خود درون‌گرایی) با نمره‌های کارکردهای دفاعی روابط منفی و معنی‌داری داشتند (۱۲). نتایج تحقیق احمدی نیز با عنوان بررسی سلامت روان ۳۶۰ دانشجوی دختر در مقطع کارشناسی رشته‌های پرستاری و غیر پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی شاهroud نشان داد که بین سلامت روان دانشجویان پرستاری و سایر رشته‌ها ارتباط معناداری وجود ندارد ولی در هر دو گروه میزان ضعف سلامت روان به شکل قابل توجهی بالا بود، این در حالی است که بین افراد خانوار، میزان درآمد ماهیانه خانواده و میزان علاقه به رشته و کاهش سلامت روان ارتباط معناداری وجود داشت (۱۳). صادقی نیز در تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط سلامت روان و موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم دریافت که بین موفقیت تحصیلی و سلامت روان دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد اما بین سلامت روان و وضعیت اقتصادی ارتباط معناداری وجود دارد (۱۴). نتایج تحقیق محمد زاده با عنوان بررسی وضعیت سلامت روانی و عوامل مؤثر بر آن در ۶۶۱ نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ایلام، نشان داد که ۱۷ درصد از دانشجویان در معرض خطر هستند و نیز بین سلامت روانی دانشجویان با رشته تحصیلی و میزان علاقه به آن رابطه معناداری وجود داشت (۱۵).

از آنجاکه ورود به دانشگاه، موقعیت حساسی برای جوانان است که اغلب با تغییرات مهمی توأم بوده و موجب مشکلات

گرفته شده است، بدین معنی که اگر نمره‌ی آزمودنی در آزمون غربالگری برابر یا بیش از ۲۳ باشد به عنوان مشکوک غربال می‌شود. این نمره‌ی برش با استفاده از تحقیقات گذشته تعیین شده است(۱۸). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین‌ها، انحراف استاندارد و ...) استفاده گردید و کلیه نتایج مربوطه از طریق نرم‌افزار Spss ۱۸ استخراج گردید.

### یافته‌ها

در پژوهش حاضر تعداد ۴۷۱ پرسشنامه توسط دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شد. دانشجویان در مقاطع کارداشی، کارشناسی و دکترای حرفه‌ای در دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی و پیراپزشکی و بهداشت مشغول به تحصیل پذیرفته شده بودند. در ۴۳۶ پرسشنامه جنسیت دانشجو مشخص گردید که از این تعداد ۱۵۶ نفر (۳۵/۸ درصد) پسر و ۲۸۰ نفر معادل ۶۴/۲ درصد دختر بودند. بیشترین فراوانی سنی مربوط به رده سنی ۱۸ تا ۲۲ سال بود. نتایج آزمون‌های آمار توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و فراوانی آزمودنی‌ها بر حسب نمره‌های پرسشنامه سلامت عمومی، جنسیت، رشته‌ی دانشگاهی، دانشکده، مقطع تحصیلی، نوع اسکان و نوع سهمیه در جداول زیر ارایه شده است.

را شامل می‌شود که در مجموعه‌های بالینی باهدف رדיابی افراد مبتلا به اختلال روانی مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش برای سنجش سلامت عمومی دانشجویان از پرسشنامه‌ی سلامت عمومی (GHQ ۲۸) گلدبگ که حاوی ۲۸ پرسش در مقیاس چهارگانه می‌باشد استفاده شد. در مطالعه انصاری و بهرامی ضرایب اعتبار برای حیطه‌های چهارگانه (سلامت جسمی، کارکرد اجتماعی، افسردگی، اضطراب) به ترتیب ۸۲، ۸۵، ۸۶ و ۸۷ درصد گزارش شده است، و برای پایایی حیطه‌های چهارگانه (سلامت جسمی، کارکرد اجتماعی، افسردگی، اضطراب) پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ به ترتیب، ضرایب ۹۱، ۹۲، ۹۸ و ۹۳ درصد و به روش تنصفی به ترتیب ۷۵، ۷۶، ۸۸ و ۸۹ درصد گزارش کرده‌اند (۷). روش‌های مختلفی برای نمره‌گذاری لیکرت استفاده شده که به صورت (۰، ۱، ۲، ۳) است، یعنی گزینه‌ی الف (نمره‌ی صفر)، گزینه‌ی ب (نمره ۱)، گزینه‌ی ج (نمره ۲) و گزینه‌ی د (نمره ۳) می‌گیرد. حداکثر نمره‌ی آزمودنی با این روش نمره‌گذاری، ۸۴ خواهد بود(۱۸). این پرسشنامه به صورت منفی نمره‌گذاری شده است، یعنی نمره صفر به معنی عدم اختلال در سلامت عمومی و نمرات بالا در این پرسشنامه نشان‌دهنده‌ی اختلال زیادتر در سلامت عمومی افراد است. و نمره‌ی ۲۳ به عنوان نمره‌ی برش در نظر

جدول ۱: توزیع فراوانی و درصد نمرات وضعیت جسمانی، اضطراب، کارکرد اجتماعی، افسردگی و کل سلامت عمومی دانشجویان

#### وروودی جدید دانشگاه علوم پزشکی زنجان

وضعیت	سلامت عمومی	جسمانی						اضطراب	افسردگی	اجتماعی	کارکرد	سلامت
		فراءانی	درصد	فراءانی	درصد	فراءانی	درصد					
پایین نمره برش ( $\leq 6$ )	۴۳۵	۹۳/۱	۳۹۱	۸۴/۸	۴۴۶	۹/۹۵	۲۸۲	۶۱/۱	۴۰۵	۹۰	درصد	افسردگی
بالای نمره برش ( $> 6$ )**	۳۲	۷/۹	۷۰	۱۵/۲	۱۹	۴/۱	۱۸۲	۳۹/۲	۴۵	۱۰	درصد	اجتماعی

\*: مناسب \*\*: نامناسب

جدول ۲: میانگین و انحراف معیار نمرات وضعیت جسمانی، اضطراب، کارکرد اجتماعی، افسردگی و کل سلامت عمومی دانشجویان  
وروودی جدید دانشگاه علوم پزشکی زنجان

سلامت عمومی(کل)		کارکرد اجتماعی		افسردگی		اضطراب		وضعیت جسمانی		گروه	
SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD	M
۵/۱۳	۱۰/۸۳	۱/۸۲	۴/۱۵	۱/۲۲	۰/۷۸	۱/۸۱	۲/۲۱	۱/۵۶	۲/۲۰	پایین نمره برش (<۶)	
۱۲/۳۳	۳۵/۰۲	۲/۵۵	۸/۸۹	۴/۱۵	۱۱	۳/۲۵	۹/۹۱	۳/۲۸	۹/۰۶	بالای نمره برش (>۶)	

\*: مناسب \*\*: نامناسب

آمار سلامت عمومی نامناسب مربوط به دانشجویان دختر (۳۳نفر)، غیربومی(۲۴نفر)، مقطع دکترای حرفه‌ای(۱۷نفر) و در رده سنی بین ۱۸تا ۲۰ سال بود.

همان‌طور که در جدول ۳ ملاحظه می‌گردد بیشترین آمار سلامت عمومی نامناسب مربوط به دانشجویان رشته‌ی پرستاری و مامایی (۱۴نفر)، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی(۱۴نفر) و سهمیه مناطق(۲۳نفر) بودند.

همان‌طور که در جدول ۱ و ۲ ملاحظه می‌گردد از میان ۴۵۰ دانشجویی که پرسشنامه سلامت عمومی را به صورت کامل پاسخ داده‌اند، تعداد ۴۰۵ نفر معادل ۹۰ درصد دارای مجموع نمره پایین نمره برش یعنی ۲۳ و تعداد ۴۵ نفر معادل ۱۰ درصد بالای نمره برش قرار داشتند که میانگین و انحراف معیار گروه اول به ترتیب ۱۰/۸۳ و ۵/۱۳ و نیز گروه دوم ۳۵/۰۲ و ۱۲/۳۳ بود.

همان‌طور که در جدول ۳ ملاحظه می‌گردد بیشترین

جدول ۳: توزیع فراوانی (تعداد) و درصد وضعیت سلامت روانی بر حسب جنس، نوع اسکان و مقطع تحصیلی

متغیر	وضعیت سلامت عمومی					
	درصد	فرافانی	(تعداد)	پایین نمره برش (<۶)	بالای نمره برش (>۶)	مجموع
دختر			۲۸۰	۳۳	۲۳۵	۲۶۸
پسر			۱۵۶	۷	۱۴۱	۱۴۸
جمع			۴۳۶	۴۰	۳۷۶	۴۱۶
بومی			۱۶۰	۱۸	۱۳۹	۱۵۷
نوع اسکان			۲۹۲	۲۴	۲۵۰	۲۷۴
غیربومی			۴۰۲	۴۲	۲۷۴	۴۳۱
جمع			۶۰۴	۷	۵۹۷	۸
کارشناسی			۲۴۳	۲۶	۲۰۶	۲۳۲
مقطع			۲۱۱	۱۷	۱۸۴	۲۰۱
دکترای حرفه‌ای			۴۶۲	۴۴	۳۹۸	۴۴۴
جمع			۶۴۶	۲۴	۵۹۷	۶۴۲

۳۹۲	۰.۹۰	۴۱۰	۳۵	۳۵۷	۱۸-۲۰	
۲۸	۶.۶	۳۰	۶	۲۲	۲۱-۲۳	سن
۱۳	۹.۲	۱۳	۰	۱۳	>۲۴	
۴۳۳	۱۰۰	۴۰۳	۴۱	۳۹۲		جمع
۹۶	۲۲.۹	۹۹	۷	۸۹	پزشکی	
۴۲	۱۰.۴	۴۵	۳	۳۹	دندانپزشکی	رشته
۰۹	۱۴.۴	۶۲	۸	۵۱	داروسازی	
۹۸	۲۴.۳	۱۰۵	۹	۸۹	پیراپزشکی	
					بهداشت	
۱۱۸	۲۸	۱۲۱	۱۴	۱۰۴	پرستاری و مامایی	
۴۱۳	۱۰۰	۴۳۲	۴۱	۳۷۲		جمع
۲۵۷	۷۴.۹	۲۶۹	۲۳	۲۳۴	آزاد و سهمیه مناطقی	
۴۶	۱۳.۶	۴۹	۵	۴۱	شاهد و ایثارگر	سهمیه
۳۸	۱۱.۴	۴۱	۳	۳۵	سایر یا خاص	
۳۴۱	۱۰۰	۳۵۹	۳۱	۳۱۰		جمع
۹۶	۲۲.۹	۹۹	۷	۸۹	پزشکی	
۴۲	۱۰.۴	۴۵	۳	۳۹	دندانپزشکی	رشته
۰۹	۱۴.۴	۶۲	۸	۵۱	داروسازی	
۹۸	۲۴.۳	۱۰۵	۹	۸۹	پیراپزشکی	
					بهداشت	
۱۱۸	۲۸	۱۲۱	۱۴	۱۰۴	پرستاری و مامایی	
۴۱۳	۱۰۰	۴۳۲	۴۱	۳۷۲		جمع

\*\*: مناسب \*\*\*: نامناسب

سنی مربوط به رده سنی ۱۸ تا ۲۲ سال بود. دانشجویان در مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه‌ای بودند که در دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی و پیراپزشکی و بهداشت مشغول به تحصیل بودند. ابتدا دانشجویان براساس مجموع نمرات کسب شده به ۲ گروه پایین نمره برش و گروه بالای نمره برش تقسیم شدند

**بحث**  
 نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از مجموع ۴۷۱ پرسشنامه کامل شده توسط دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی زنجان، در ۴۳۶ پرسشنامه جنسیت دانشجویان مشخص گردید که از این تعداد ۱۵۶ نفر (۳۵/۸ درصد) پسر و ۲۸۰ نفر معادل ۶۴/۲ درصد دختر بودند. بیشترین فراوانی

از نتایج دیگر پژوهش این بود که میانگین و انحراف معیار نمرات کسب شده توسط دانشجویان ورودی جدید در حیطه اضطراب به ترتیب در گروه اول(مناسب) ۲/۲۱ و ۱/۸۱ و در گروه دوم(نامناسب) ۳/۲۵ و ۹/۹۱ میباشد، نمره برش در حیطه های چهارگانه پرسشنامه سلامت عمومی نمره ۶ میباشد همان طور که جدول ۱ نشان داد از مجموع ۴۶۱ دانشجویی که به سوالات این حیطه در پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده بودند تعداد ۳۹۱ نفر دارای نمره کمتر از نمره برش بودند و تعداد ۷۰ نفر از دانشجویان نمره برش را رد کرده و مشکوک به اختلال بودند. نتایج مطالعات قبلی نیز میین بالاتر بودن اختلال در حیطه اضطراب نسبت به حیطه سلامت جسمی است(۲۶، ۲۵، ۲۲، ۱۹، ۲۰).

نتایج در حیطه کارکرد اجتماعی نشان داد، میانگین و انحراف معیار نمرات کسب شده توسط دانشجویان ورودی جدید در این حیطه به ترتیب در گروه اول(مناسب) ۴/۱۵ و ۱/۸۲ و در گروه دوم(نامناسب) ۸/۸۹ و ۲/۵۵ میباشد، از مجموع ۴۶۴ دانشجویی که به سوالات این حیطه در پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده اند تعداد ۲۸۲ نفر دارای نمره کمتر از نمره برش میباشدند و تعداد ۱۸۲ نفر از دانشجویان نمره برش را رد کرده و مشکوک به اختلال هستند. یافته های این مطالعه با نتایج مطالعات مشابه همسویی دارد، در مطالعات قبلی نیز حیطه کارکرد اجتماعی دارای بالاترین میزان اختلال بوده است(۲۷ و ۱۷).

نتایج وضعیت سلامت دانشجویان در حیطه افسردگی نیز نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمرات کسب شده توسط دانشجویان ورودی جدید در سلامت جسمانی به ترتیب در گروه اول ۰/۷۸ و ۰/۲۲ و در گروه دوم ۱۱ و ۴/۱۵ میباشد از مجموع ۴۶۵ دانشجویی که به سوالات این حیطه در پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده اند، تعداد ۴۴۶ نفر دارای نمره کمتر از نمره برش میباشدند و تعداد ۱۹ نفر از دانشجویان نمره برش را رد کرده و مشکوک به اختلال

که در این میان ۴۰۵ نفر از دانشجویان دارای نمره پایین تر از نمره برش که نشان دهنده سالم بودن سطح سلامت عمومی آنان میباشد و تعداد ۴۵ نفر از دانشجویان دارای نمرات بالاتر از نمره برش میباشند که نشان می دهد این افراد مشکوک به اختلال میباشند که به ترتیب همان گونه که جداول توصیفی نشان داد، میانگین و انحراف معیار گروه اول به ترتیب ۱۰/۸۳ و ۵/۱۳ و نیز گروه دوم ۳۵/۰۲ و ۱۲/۳۳ بود. در بررسی نتایج مطالعات مشابه مبنی بر اینکه از نظر سلامت عمومی اکثر دانشجویان از وضعیت مناسب برخوردار میباشد و تعداد کمی از دانشجویان وضعیت سلامت عمومی آنها نامناسب گزارش شده است، مشخص شد که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان از نظر وضعیت کلی سلامت عمومی در شرایط مطلوبی قرار دارند(۲۰، ۱۹، ۱۵).

یکی دیگر از نتایج پژوهش نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمرات کسب شده توسط دانشجویان ورودی جدید در سلامت جسمانی به ترتیب در گروه اول(مناسب) ۲/۲۰ و ۱/۵۶ و در گروه دوم(نامناسب) ۹/۵۶ و ۳/۲۸ میباشد، نمره برش در حیطه های چهارگانه پرسشنامه سلامت عمومی ۶ میباشد که با توجه به میانگین های به دست آمده می توان بیان نمود که سطح سلامت جسمانی دانشجویان در وضعیت مطلوبی میباشد. از مجموع ۴۶۷ دانشجویی که به سوالات این حیطه در پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده اند تعداد ۴۳۵ نفر دارای نمره کمتر از نمره برش میباشدند و تنها تعداد ۳۲ نفر از دانشجویان نمره برش را رد کرده و مشکوک به اختلال میباشند، که این نتایج نشان می دهد وضعیت دانشجویان در خرده مقیاس سلامت جسمانی مطلوب میباشد و از این حیث در بین مطالعات انجام گرفته قبلی مبنی بر رد شدن از نمره برش و مشکوک بودن به اختلال در حیطه سلامت جسمانی، دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی زنجان در وضعیت سلامت جسمانی بهتری قرار دارند (۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱).

نتایج تعیین وضعیت سلامت عمومی بر اساس مقطع تحصیلی نشان داد بیشترین فراوانی مربوط به مقطع کارشناسی با ۲۴۳ نفر می‌باشد، مقاطع دکترای حرفه‌ای با ۲۱۱ دانشجو و نیز مقطع کاردانی با ۸ نفر در رده‌های بعدی قرار دارند. از مجموع ۴۴۲ نفری که به صورت کامل به سوالات پرسشنامه جواب داده‌اند، در مقطع دکترای حرفه‌ای تعداد ۱۷ نفر، کارشناسی ۲۴ نفر و مقطع کاردانی ۱ نفر دارای نمره‌ای بالاتر از نمره برش بوده و مشکوک به اختلال بودند. نتایج تعیین وضعیت سلامت عمومی بر اساس نوع سهمیه ورودی نشان داد بیشترین فراوانی دانشجویان بر اساس سهمیه ورودی مربوط به سهمیه آزاد و مناطق با ۷۴/۹ درصد می‌باشد در رده‌های بعدی سهمیه شاهد و ایثارگر و سایر یا خاص به ترتیب با ۱۳/۶ و ۱۱/۴ درصد قرار دارند، همچنین از مجموع دانشجویان با ورودی سهمیه مناطق و آزاد تعداد ۲۳ نفر مشکوک به اختلال بودند در سهمیه شاهد و ایثارگر تعداد ۵ نفر و نیز در سهمیه سایر یا خاص تعداد ۳ نفر مشکوک به اختلال بودند.

نتیجه دیگر پژوهش به‌منظور تعیین وضعیت سلامت عمومی دانشجویان بر اساس نوع اسکان نشان داد از مجموع ۴۵۲ دانشجویی که وضعیت اسکان خود را در پرسشنامه سلامت عمومی مشخص نموده‌اند تعداد ۱۶۰ نفر بومی و ۲۹۲ نفر غیربومی می‌باشند، از این تعداد ۴۳۱ نفر از دانشجویان ۱۸ به‌تمامی سوالات پرسشنامه جواب داده بودند همچنین ۲۴ نفر از دانشجویان بومی و ۲۴ نفر از دانشجویان غیربومی مشکوک به اختلال بودند. این یافته نیز با تحقیق کرمی و پیراسته مبنی بر بالا بودن اختلال در سلامت عمومی بین دانشجویان غیربومی، همسو می‌باشد.<sup>(۳۰)</sup>

### نتیجه‌گیری

در مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وضعیت سلامت عمومی دانشجویان در حیطه‌های چهارگانه (سلامت

می‌باشند بررسی مطالعات مشابه نشان می‌دهد که وضعیت دانشجویان در این مطالعه از نظر مؤلفه مذکور در شرایط مطلوبی قرار دارد<sup>(۱۲،۱۷،۱۹،۲۲)</sup>.

نتایج تعیین وضعیت سلامت عمومی دانشجویان بر اساس جنسیت نشان داد از مجموع ۴۷۱ دانشجوی ورودی جدید دانشگاه که پرسشنامه سلامت عمومی را کامل نمودند، ۴۳۶ دانشجو جنسیت خود را مشخص نمودند که از این تعداد ۱۵۶ دانشجو پسر و ۲۸۰ نفر دختر بودند همچنین ۱۴۱ نفر از دانشجویان پسر و ۲۲۵ نفر از دانشجویان دختر نمره‌ای پایین‌تر از نمره برش کسب کرده‌اند که نشان‌دهنده‌ی مناسب بودن سطح سلامت عمومی آنان می‌باشد، مابقی دانشجویان یعنی ۷ پسر و ۳۳ دختر نیز نمره‌ای بالای نمره برش کسب نمودند که مشکوک به اختلال می‌باشند. تحقیقات همسو با پژوهش حاضر در رابطه با همه‌گیرشناختی بیماری‌های روانی در سطح جهان و نیز داخل کشور نشان‌دهنده شیوع بیشتر بیماری‌های روانی در زنان نسبت به مردان می‌باشند<sup>(۱۲،۱۷،۱۸،۲۸،۲۲،۲۹)</sup>.

نتایج تعیین وضعیت سلامت عمومی دانشجویان بر اساس رشته‌ی تحصیلی نشان داد بیشترین فراوانی دانشجو مربوط به رشته‌های پرستاری، مامایی، هوشبری، اتاق عمل و فوریت‌های پزشکی می‌باشد بعد از رشته‌های مربوط به دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، رشته‌های پیراپزشکی و بهداشت دارای بالاترین فراوانی بودند، رشته‌های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی در رده‌های بعدی قرار دارند. در مورد توزیع اختلال بر اساس رشته‌ی تحصیلی نیز می‌توان گفت که میزان اختلال تقریباً در بین رشته‌های تحصیلی یکسان می‌باشد و تفاوت محسوسی در تعداد دانشجویانی که نمره برش را رد نموده‌اند مشاهده نمی‌شود و این یافته با نتایج قبلی مبنی بر این‌که بین سلامت روان دانشجویان رشته‌های مختلف باهم تفاوت معناداری وجود ندارد فهمخوان است<sup>(۱۳و۳۰)</sup>.

برخی متغیرهای جمعیت شناختی مانند وضعیت اقتصادی و طبقه اجتماعی دانشجویان بود. لذا پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آینده استفاده از روش‌های دیگری مانند مصاحبه بالینی و مشاهده جهت جمع‌آوری اطلاعات و لحاظ کردن متغیرهای جمعیت شناختی بیشتر جهت رسیدن به نتایج دقیق‌تر توصیه می‌شود. همچنین مسؤولین محترم توجه بیشتری به دانشجویان غیربومی و دارای وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین‌تر جهت بهبود وضعیت سلامت عمومی و به‌تبع آن رشد تحصیلی و استعدادهای دانشجویان مبذول دارند.

### تقدیر و تشکر

A-11- این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با کد مصوب ۱-۹۱۱ و تحت حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می‌باشد. پژوهشگران بر خود لازم می‌دانند از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و همچنین تمامی دانشجویان که امکان انجام این پژوهش را فراهم نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند.

جسمی، کارکرد اجتماعی، افسردگی، اضطراب)، بیشتر در حیطه کارکرد اجتماعی نمرات دانشجویان مشکوک به اختلال بود و نمرات آن‌ها در این حیطه بالاتر از نمره برش به دست آمد. می‌توان گفت که در بدلو ورود به دانشگاه این امر تا حدی طبیعی بوده و به مرور از میزان ضعف کارکرد اجتماعی دانشجویان کاسته می‌شود، اگرچه تدبیر مؤسسات آموزشی در برنامه‌ریزی صحیح آموزشی فرهنگی جهت تسريع افزایش مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی نقش بسیار مهمی دارد. همچنین وضعیت سلامت عمومی دانشجویان پسر، بومی و مقطع دکترای حرفه‌ای مناسب‌تر از وضعیت سلامت عمومی دانشجویان دختر، غیربومی و مقطع کارданی و کارشناسی بود. که می‌توان گفت زنان به دلیل ناتوانی در سازش با محیط و انعطاف‌پذیری در مواجهه با محدودیت‌ها و فشارهای روانی بیشتر از جنس مخالف مبتلا به بیماری‌های روانی می‌شوند. اما در متغیرهای رشته تحصیلی و دانشکده بین دانشجویان تفاوت چندانی مشاهده نشد. مهم‌ترین محدودیت این پژوهش استفاده صرف از پرسشنامه جهت بررسی وضعیت سلامت عمومی دانشجویان و عدم همتاسازی آن‌ها از لحاظ

### Reference

- 1- milanifar B. Mental Health. Tehran. Publications Gomes; 1992.
- 2- Milanifar B. Mental health. Tehran: Ghooms Publication. 2003; 3. 5-40. [In Persian].
- 3- Holm-Hadulla R, Soeder U. Psychological complaints and disorders of students. *Psychother Psychosom Med Psycho*. 1997; 47(12):419-25.
- 4- Tavakolizadeh J, Moshki M, Hosseini Shahidi L, Maroozi P. The survey of stressor events and their relationship with mental disorders on youths in Gonabad city. *Ofogh e Danesh*. 2003; 9(1).

### [In Persian]

- 5- Bailer J, Schwarz D, Witth M, Stübinger C, Rist F. Prevalence of mental disorders among college students at a German university. *Psychother Psychosom Med Psychology* 2008; 58(11):9-423.
- 6- Liod G, Musser LA. Psychiatric symptoms in dental students. *J Nerve Ment Dis*. 1989; 177(2): 61-69.
- 7- Sadeghi H, Abedini Z; Norouzi M. Assessment of relationship between mental health and educational success in the students of Qom

- University of Medical Sciences. *Qom Univ Med Sci J* 2013; 7(Supple 1):17-22. [Full Text in Persian].
- 8- Ansari H, Bahrami L. Evaluation of public health University of Medical Sciences. *Tabibe shargh*. 2007; 9(4). [In Persian].
- 9- Tavakolizade J, Ghahremani M, Chamanzari H. The survey of mental health status in Gonabad Medical Sciences College students in 2001-2002. *J Gonabad Med Sci H Serv* 2002-2003; 8(2): 47-54. [In Persian].
- 10- Maghsoudi A, Tabrizi R. The study of General health status and its affecting original article factors on students of Kerman University of Medical Sciences in. *Research Center for Modeling in Health*. Vol. 1, No. 1, June 2014, P.59-670.
- 11- Esfandiari GH. Stress factors and their relation with general health in students of Kurdistan University of Medical Sciences in 1999. *SJKU*. 2001; 5(2): 17-21. [In Persian].
- 12- Ghamarigivi H, Basic functions of defense and the role of students in the field of mental health. *mental health, Proceedings of the Third Seminar*. 2006; 302-4. [In Persian].
- 13- Ahmadi Z, Sobhaiy F. Assessment of mental health nursing and non-nursing students of Islamic Azad University anymore, *Journal of Islamic Azad University*.2007; 17(2). [In Persian].
- 14- Sadeghi H, Abedini Z; Norouzi M. Assessment of relationship between mental health and educational success in the students of Qom University of Medical Sciences. *Qom Univ Med Sci J* 2013; 7(Suppl 1):17-22. [Full Text in Persian].
- 15- Mohammadzadeh J, KHosravi A. Study of mental health and its risk factors among Ilam University. *Journal of Health System*.2012; 8(5). [In Persian].
- 16- Garousi farshi M, Sofiyani H. The relationship between Personality dimensions & mental health in Tabriz sciences college students. *J Psych Educ study*. 2008; 9(2): 47-63. [In Persian]
- 17- Rezai R, Beheshti Z, Hajhoseini F, Seiedandi J. Study of compare mental health in primary and latest nursing students. *Iran J Nurs Res* 2006; 1(3):67-74. [Full Text in Persian].
- 18- WHO. Promoting mental health: concepts, emerging evidence and practice: report of the World Health Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse in collaboration with the Victorian Health Promotion Foundation and the University of Melbourne; 2005.
- 19- Omidian M. General state of health and welfare studies at the University of Yazd. *Psychology studies Ferdowsi University of Mashhad*. 2009; 10(1):101-16. [In Persian].
- 20- Taleghani N, Roghanchi M, SHokri M. The relationship between the religious orientation and mental health. *Proceedings of the Second Seminar mental health*. 2006; 254-258. [In Persian].
- 21-Hosaini A. Preliminary study of the second edition of principles of psychology, Tehran, Islamic Culture Publishing Office. 1995;

[In Persian].

22- SHamloo S. School and theory in personality psychology, sixth edition, Tehran, emissions growth; 1990.

23- Liod G, Gartrell NK. Psychiatric symptoms in medical students. *Comp psych.* 1994; 25: 552-65.

24-Ashoori A, Sadikhni A, Mohammadzadeh A. Explore the relationship between coping strategies and mental health in students of Shiraz University, Proceedings of the Second National Seminar on mental health, *Tarbiat Modarres University*; 2004. [In Persian].

25- Asgharipour SH, Masoudi SH. Assess the mental health of married students at Ferdowsi University of Mashhad, the end of a degree, discipline of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad; 2004;11(3).

26- Pourafkari N. English to Persian cultural psychology, psychiatry, Tehran. Contemporary culture; 2004.

27- Ahmandvand M. Mental health. Tehran, Payam Noor University; 2003.

## ***General Health Status of Newly Arrived Students of Zanjan University of Medical Sciences in the Academic Year 2014-2015***

**Fakour E<sup>1</sup>, Vakili M<sup>1</sup>, Rostami B<sup>1</sup>, Mohammad Beigi N<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

**Corresponding author:** Fakour E, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

**Email:** Ehsan.fakour@gmail.com

**Received:** 16 Jun 2015    **Accepted:** 18 Oct 2015

**Background and Objective:** Students general health is the most important factor in their education at university. Since the task of university is training committed and efficient human resources, it is also possible with a balanced growth in all aspects of mental health .This study aimed to assess the general health of new students in Zanjan University of Medical Sciences in the first semester of the academic year 93-94.

**Materials and Methods:** This was a descriptive study. All new students in Zanjan University of Medical Sciences in the first semester of the academic year 93-94, who were more than 471 people, were population of this research. Sampling was done randomly for this research. Goldberg general health questionnaire (GHQ 28) was given to all of them in order to gather data. Descriptive statistics (mean, standard deviation, etc.) were used to analyze data.

**Results:** Of 471 students, 156 (35.8%) were male and 280 (64.2%) were female. The highest frequency of age was 18-22. The average score and standard division in the first group were respectively 10.83 and 5.13 and in the second group were 35.02 and 12.33. From the subscales of general health, social functioning factor had the maximum number of students who were suspected of having disorders. Regarding general health problems, females (33 persons, 14%) had a higher prevalence.

**Conclusion:** General health of students in this study was reported at an appropriate level. Just the social function of the students seemed inappropriate. So, according to the results, it is essential that authorities continue these types of research and apply the results in cultural planning and spend more effort in such studies.

**Keywords:** *Public health, New students, Zanjan University of Medical Sciences*